

平成 27 年 3 月 20 日

一般社団法人日本病理学会  
理事長 深山 正久 殿

公益社団法人 日本産科婦人科学会  
理事長 小西 郁生  
同 婦人科腫瘍委員会  
委員長 青木 大輔

卵巣癌、卵管癌、腹膜癌手術進行期分類への改訂についてのお知らせ

時下、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

昨年 1 月に International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) より、卵巣癌・卵管癌・腹膜癌の新進行期分類 (FIGO2014) が発行になったことに伴い、本学会においても検討を行い、卵巣癌・卵管癌・腹膜癌手術進行期分類 (日産婦 2014, FIGO2014, 付記参照) に改訂いたしました。それに伴いまして、本学会としては、2015 年 1 月 1 日以降に治療を開始した症例につきましては、新進行期分類を採用する運びとなりました。

現在、本学会では貴学会のご協力のもと、卵巣腫瘍取扱い規約の改訂作業を行っております。本来であれば、新卵巣腫瘍取扱い規約の発刊を待って、新進行期分類への移行を行いますところ、国際的な診断基準との乖離が生じることを危惧し、新進行期分類への移行を迅速に行うことといたしました。貴学会におかれましては上記の事情をご理解いただき、会員各位への周知についてご配慮賜りますようお願い申し上げます。

末筆ながら、貴学会の益々のご発展を祈念しております。

以上

付記：

卵巢癌・卵管癌・腹膜癌 新手術進行期分類

原文 (FIGO2014)：

Stage I: Tumor confined to ovaries or fallopian tube(s)

IA: Tumor limited to one ovary (capsule intact) or fallopian tube; no tumor on ovarian or fallopian tube surface; no malignant cells in the ascites or peritoneal washings

IB: Tumor limited to both ovaries (capsules intact) or fallopian tubes. No tumor on ovarian or fallopian tube surface. No malignant cells in the ascites or peritoneal washings

IC: Tumor limited to one or both ovaries or fallopian tubes, with any of the following

IC1 Surgical spill

IC2 Capsule ruptured before surgery or tumor on ovarian or fallopian tube surface

IC3 Malignant cells in the ascites or peritoneal washings

Stage II: Tumor involves one or both ovaries or fallopian tubes with pelvic extension (below pelvic brim) or primary peritoneal cancer

IIA: Extension and/or implants on the uterus and/or fallopian tubes and/or ovaries

IIB: Extension to other pelvic intraperitoneal tissues

Stage III: Tumor involves one or both ovaries, fallopian tubes, or primary peritoneal cancer, with cytologically or histologically confirmed spread to the peritoneum outside the pelvis and/or metastasis to the retroperitoneal lymph nodes

IIIA1: Positive retroperitoneal lymph nodes only (cytologically or histologically proven)

IIIA1 (i) Metastasis  $\leq 10$  mm in greatest dimension

IIIA1 (ii) Metastasis  $> 10$  mm in greatest dimension

IIIA 2: Microscopic extrapelvic (above the pelvic brim) peritoneal involvement with or without positive retroperitoneal lymph nodes

IIIB: Macroscopic peritoneal metastasis beyond the pelvis up to 2 cm in greatest dimension, with or without metastasis to the retroperitoneal lymph nodes

IIIC: Macroscopic peritoneal metastasis beyond the pelvis more than 2 cm in greatest dimension, with or without metastasis to the retroperitoneal lymph nodes (includes extension of tumour to capsule of liver and spleen without parenchymal involvement of either organ)

Stage IV: Distant metastasis excluding peritoneal metastasis

IVA: Pleural effusion with positive cytology

IVB: Parenchymal metastases and metastases to extra-abdominal organs (including inguinal lymph nodes and lymph nodes outside of abdominal cavity)

参考文献： Prat J; FIGO Committee on Gynecologic Oncology. Staging classification for cancer of the ovary, fallopian tube, and peritoneum. Int J Gynaecol Obstet. 2014; 124(1): 1-5

## 手術進行期分類（日産婦 2014, FIGO2014）

I 期：卵巣あるいは卵管内限局発育。

IA 期：腫瘍が一侧の卵巣（被膜破綻がない）あるいは卵管に限局し、被膜表面への浸潤が認められないもの。腹水または洗浄液の細胞診にて悪性細胞の認められないもの

IB 期：腫瘍が両側の卵巣（被膜破綻がない）あるいは卵管に限局し、被膜表面への浸潤が認められないもの。腹水または洗浄液の細胞診にて悪性細胞の認められないもの

IC 期：腫瘍が一侧または両側の卵巣あるいは卵管に限局するが、以下のいずれかが認められるもの

IC1：手術操作による被膜破綻

IC2：自然被膜破綻あるいは被膜表面への浸潤

IC3：腹水または腹腔洗浄細胞診に悪性細胞が認められるもの

II 期：腫瘍が一侧または両側の卵巣あるいは卵管に存在し、さらに骨盤内（小骨盤腔）への進展を認めるもの、あるいは原発腹膜癌

IIA 期：進展ならびに/あるいは転移が子宮ならびに/あるいは卵管ならびに/あるいは卵巣に及ぶもの

IIB 期：他の骨盤部腹腔内臓器に進展するもの

III 期：腫瘍が一侧または両側の卵巣あるいは卵管に存在し、あるいは原発性腹膜癌で、細胞学的あるいは組織学的に確認された骨盤外の腹膜播種ならびに/あるいは後腹膜リンパ節転移を認めるもの

IIIA1 期：後腹膜リンパ節転移陽性のみを認めるもの（細胞学的あるいは組織学的に確認）。

IIIA1(i)：転移巣最大径 10mm 以下

IIIA1(ii)：転移巣最大径 10mm を超える。

IIIA2 期：後腹膜リンパ節転移の有無にかかわらず、骨盤外に顕微鏡的播種を認めるもの

IIB 期：後腹膜リンパ節転移の有無にかかわらず、最大径 2cm 以下の腹腔内播種を認めるもの

IIIC 期：後腹膜リンパ節転移の有無にかかわらず、最大径 2cm を超える腹腔内播種を認めるもの（実質転移を伴わない肝および脾の被膜への進展を含む）

IV 期：腹膜播種を除く遠隔転移

IVA 期：胸水中に悪性細胞を認める

IVB 期：実質転移ならびに腹腔外臓器（鼠径リンパ節ならびに腹腔外リンパ節を含む）に転移を認めるもの

参考文献：卵巣癌・卵管癌・腹膜癌手術進行期分類の改訂および外陰癌，腔癌，子宮肉腫，子宮腺肉腫手術進行期分類の採用について。日産婦誌。2014；66：2736-2741